

ВИЧ СПИД

профилактика

ВИЧ через:

нестерильность и повторное использование игл для инъекций, в том числе и внутривенных



130 случаев заражения в год

профилактика: презервативы и др.

главным образом использование игл, а также для других инъекционных процедур

вакцинация против ВИЧ



ВИЧ В РОССИИ

В течение 10-12 лет вирус может существовать в организме человека **бессимптомно!**

Важно знать: случаи заражения происходят только при

наличие ВИЧ-инфекции у одного из партнеров



Слід дотримуватися правил профілактики і захисту від передачі вірусу і захворювання СНІДом

Вірусологічний профілактичний препарат



Важко уявити собі, як передається СНІД. Найпростіше це відбувається при статевому контакті без використання презервативу. Інфекція передається також при використанні зараженого інструменту (наприклад, голівки бритви, шпатель, голівка шприца тощо).

Важливо пам'ятати, що СНІДом можна захворіти тільки один раз!



Трансмісія вірусу СНІДом

Материнська передача



У деяких випадках СНІДом можна захворіти при передачі вірусу СНІДом від матері до дитини.

Вакцинація проти СНІДу

Важко уявити собі, як передається СНІД. Найпростіше це відбувається при статевому контакті без використання презервативу.

Слід пам'ятати, що СНІДом можна захворіти тільки один раз!

Важливо пам'ятати, що СНІДом можна захворіти тільки один раз!



Важко уявити собі, як передається СНІД. Найпростіше це відбувається при статевому контакті без використання презервативу.



Важко уявити собі, як передається СНІД. Найпростіше це відбувається при статевому контакті без використання презервативу.

-  Використання презервативу при статевому контакті.
-  Використання стерильних шприців при введенні препаратів.
-  Використання стерильних голівки бритви, шпатель, голівка шприца тощо.



ВИЧ
передается

- при незащищенных половых контактах;
- через медицинские иглы и шприцы;
- при внутривенном введении наркотиков;
- от ВИЧ-инфицированной женщины ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью.

ВИЧ
контактами

- бытовым путем;
- при рукопожатии;
- при дружеском поцелуе;
- при уходе насморком;
- в транспорте;
- при кашле и чихании;
- в бассейне.



**Что нужно
знать
о ВИЧ -
инфекции?**

РАБОТА АННО ШИШЕВЕНКО